




M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



ENTERO-TEST[®]

LO MEJOR PARA UN BUEN DIAGNOSTICO.



**EL ÚNICO TEST
COMPARABLE A LA PRUEBA
DE BIOPSIA POR ENDOSCOPIA.**

LAS VENTAJAS:

- ✓ **No es necesaria la endoscopia**
- ✓ **No invasivo**
- ✓ **No radioactivo**
- ✓ **Preciso**
- ✓ **Barato**
- ✓ **100% de Sensibilidad**
- ✓ **100% Especificidad con Ph Gástrico \leq 5**

El Entero-Test[®] ó Test del hilo abarca el área del estómago donde existen los diferentes parásitos como Clonorchis Sinensis, Giardia Lamblia, Stroglyoides Stercolaris, etc... y Helycobacter Pylori.

Con una serología diferente al análisis de sangre o al test del aliento, el Entero-test[®] es un dispositivo óptimo que se puede administrar fácilmente en la propia consulta del doctor.

Las Asociaciones de Enfermedad e historia del **Helicobacter Pylori**

Quien debe hacerse la prueba de Helicobacter Pylori y quien debe tratarse.

Método de diagnostico.

Otros métodos:

- El primero descrito por Warren y Mariscal en 1.983.
- La más común de las infecciones crónicas a nivel mundial.
- 95% de las úlceras duodenales y el 80% de las úlceras gástricas están asociadas con el HELICOBACTER PYLORI.
- Fuertemente asociado con diferentes adenocarcinomas de estómago y el lymphoma gástrico Malta .

- Se recomienda hacer la prueba a todos los pacientes con úlceras gástricas o duodenales.
- Pacientes con reaparición de úlceras, para la erradicación del Helicobacter Pylori.
- Pacientes que sufrieron úlceras sangrantes.
- Pacientes con terapia de largo plazo de mantenimiento de úlceras de estomago.
- Los pacientes con Helicobacter Pylori que no tengan úlcera gástrica o duodenal pueden tener a veces los síntomas de pacientes sin Helicobacter Pylori.

- El Entero-Test[®] es la única prueba comparable a la biopsia por endoscopia, Es preciso y muy barato. Puede administrarse en la consulta del doctor.

- **Test rápido de ureasa (CLOTTEST):** Comparable a la histología pero mucho más barata y más adecuada.
- **La histología:** La exactitud depende de la experiencia del Técnico y del colorante apropiado. Es relativamente cara.
- **La Serología:** No define el actual Helicobacter Pylori.
- De actividad menos precisa que la histología o el test rápido de ureasa.
- **El test del aliento** es engorroso y muy caro.
- **El Cultivo en el Laboratorio:** es más caro, no apropiado, es útil para sensibilidad al antibiótico.

Referencias:

1. Marshall, B.J.,McGeachie, D.B., Rogers, P.A.R., Glancy, R.G.: Pyloric Campylobacter Infeccion and Gastroduodenal Disease. Med.J.Aug., 1985; 149:439-44.
2. **Pérez Trallero, Emilio** et al. Non-endoscopic Method to Obtain Helicobacter Pylori for Culture.Lancet, 1995;345,622-23.
3. Fedalei,A.G., Parker, A.L., Kadaki, S.C., Englehart, H.: Evaluation of the string test (Entero-Test) for Diagnosing Helicobacter Pylori Infection. A-16 A.G.A. Abstracts Gastroenterology Vol. 110, nº 4.
4. Jung, C.,Ferguson, D.A., Jr., Chi, D.S.,Li, C.,Ha, T. Thomas, E.: Novel, Non-Invasive Successful Approach for the Detection of Gastric Helicobacter Pylori infection Using the String Test for the Culture Urease Test & PCR. 91st Annual Scientific Assembly of Southern Medical Association,1997 Charlotte NC

Para cualquier pregunta sobre el Entero-Test contacte con su distribuidor local autorizado de HDC.

Importador en exclusiva para España: **M.R.M. COMERCIAL, S. A.**

